EFEITOS TÓXICOS DE HERBICIDAS À BASE DE GLIFOSATO (GBH) EM MODELOS DE EMBRIÃO DE GALINHA¹

Nadine Leiria Paré², Rafael Schneider Costa³, Giuliam Kátia Strücker⁴

¹ Trabalho desenvolvido por alunos de Pós Graduação da UNIJUÍ.

² Bacharel em Ciências Biológicas, mestranda do Programa de Pós Graduação *stricto sensu* em Atenção Integral à Saúde da UNIJUÍ. E-mail: nadine.pare@sou.unijui.edu.br

³ Bacharel em Ciências Biológicas, mestrando bolsista Capes do Programa de Pós Graduação *stricto sensu* em Sistemas Ambientais e Sustentabilidade da UNIJUÍ. E-mail: rafael.costa@sou.unijui.edu.br

⁴ Professora Doutora da UNIJUÍ do Curso de Ciências Biológicas. E-mail: giuliam.strucker@sou.unijui.edu.br

Introdução: O glifosato (N-(fosfometil)glicina) é o herbicida mais utilizado no mundo, presente em diversas formulações comerciais aplicadas em áreas agrícolas e não agrícolas. Sua ação ocorre por meio da inibição da enzima 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato sintase (EPSPs), na via do chiquimato das plantas, impedindo a produção de aminoácidos aromáticos essenciais (fenilalanina, tirosina e triptofano), o que teoricamente reduziria seu risco para vertebrados, já que essa via metabólica está ausente nesses organismos. No entanto, estudos indicam que herbicidas à base de glifosato (GBH), assim como seu subproduto o ácido aminometilfosfônico (AMPA), podem causar efeitos tóxicos em diferentes tecidos e órgãos, incluindo o sistema nervoso. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) classificou o glifosato como “provavelmente cancerígeno” (grupo 2A), destacando sua capacidade de induzir estresse oxidativo e danos ao DNA. Modelos experimentais, como o embrião de galinha, têm sido amplamente utilizados para investigar os efeitos embriotóxicos dessas substâncias, devido à sua semelhança com outros vertebrados em fases iniciais do desenvolvimento e à facilidade de observação e manipulação em laboratório.

Objetivos: Avaliar os efeitos tóxicos do GBH em modelos de embrião de galinha (*Gallus domesticus*) descritos na literatura.

Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa a partir de buscas nas bases de dados *Web of Science*, *PubMed* e *SciELO*, utilizando os descritores: “Embriotoxicidade”, “Modelo de embrião de galinha”, “Herbicidas à base de glifosato” e “Glifosato e embrião de galinha”. A busca de dados ocorreu em março de 2025, selecionando artigos de 2010-2022. Foram considerados apenas estudos que abordam diretamente os efeitos tóxicos de GBH nesse modelo experimental, sendo excluídos aqueles sem relação direta com o tema.

Resultados: Ao todo foram selecionados 10 artigos relacionados com a embriotoxicidade do GBH em embriões de *G. domesticus*. A investigação da toxicidade do glifosato em diferentes modelos animais é uma ferramenta essencial para compreender os mecanismos de defesa envolvidos em seus efeitos tóxicos. O embrião de galinha destaca-se nesse sentido por ser acessível, de fácil obtenção e disponível o ano todo. Apresenta desenvolvimento rápido e características genéticas bem conhecidas. Por ser um amniota, seu desenvolvimento embrionário se assemelha ao dos mamíferos, mas com menor complexidade fisiológica devido à ausência de placenta, e, conseqüentemente, de eventos que possam ocorrer no organismo da mãe. Na literatura estudos sugerem que além do câncer a exposição ao glifosato também tem efeitos tóxicos em organelas, diferentes tecidos e órgãos. No fígado e intestino delgado de embriões tratados com glifosato puro e Roundup®, foram observadas

alterações histopatológicas e estresse oxidativo. Além disso, a expressão das enzimas do citocromo P450, bem como dos transportadores MDR1 e MRP2, foi modulada nesses tecidos, indicando potenciais riscos à saúde animal e humana. Alterações bioquímicas séricas, estresse oxidativo e danos histopatológicos nos rins também foram observadas em embriões de galinha tratados com glifosato puro e Roundup®. GBH também demonstram a capacidade causar perda gradual dos domínios dos rombômeros, redução das vesículas ópticas e microcefalia, indicando efeitos teratogênicos consistentes relacionados, principalmente, ao aumento da atividade retinoide endógena. Estudos também evidenciam que a exposição ao Roundup® durante o desenvolvimento embrionário de *G. domesticus* aumenta a mortalidade e compromete o crescimento e desenvolvimento morfológico. **Conclusões:** Os estudos analisados evidenciam que GBH, incluindo o glifosato puro e formulações comerciais como o Roundup®, podem induzir uma série de efeitos tóxicos em embriões de *G. domesticus*. Esses efeitos incluem alterações morfológicas, bioquímicas e histológicas em órgãos como fígado, rins e intestino, além de comprometimento do desenvolvimento neural e aumento da mortalidade embrionária. Tais achados reforçam o potencial risco que essas substâncias representam não apenas para o modelo aviário, mas também para outros vertebrados, incluindo humanos. Portanto, o uso do embrião de galinha como modelo experimental se mostra relevante e eficaz para a avaliação dos impactos do glifosato no desenvolvimento embrionário. Nesse contexto, destaca-se também a importância de novos estudos que explorem não apenas os efeitos já conhecidos, mas outros eventos celulares e moleculares pouco investigados, como a mitofagia, bem como os impactos sobre o sistema nervoso central e periférico e outros tecidos-alvo. A ampliação desse conhecimento é essencial para compreender plenamente os mecanismos de toxicidade dos GBH e seus possíveis riscos à saúde animal e humana. **Palavras-chave:** Toxicidade. Glifosato. Desenvolvimento embrionário. Embrião de galinha **Agradecimentos:** Agradecemos ao Programa de Pós Graduação *Stricto Sensu* em Atenção Integral à Saúde e ao Programa de Pós Graduação *Stricto Sensu* em Sistemas Ambientais e Sustentabilidade da UNIJUÍ. **Referências** Fathi, M.A., et al. (2020). Disrupção das enzimas do citocromo P450 no fígado e intestino delgado de embriões de galinha *in ovo* expostos ao glifosato. *Environmental Science and Pollution Research*, 27, 16865–16875. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-08269-3> Bukowska, B., et al. (2022). Fathi MA, Abdelghani E, Shen D, Ren X, Dai P, Li Z, Tang Q, Li Y, Li C. Effect of *in ovo* glyphosate injection on embryonic development, serum biochemistry, antioxidant status and histopathological changes in newly hatched chicks. *J Anim Physiol Anim Nutr (Berl)*. 2019 Nov;103(6):1776-1784. doi: 10.1111/jpn.13181. Epub 2019 Aug 27. PMID: 31453655. Paganelli A, Gnazzo V, Acosta H, López SL, Carrasco AE. Glyphosate-based herbicides produce teratogenic effects on vertebrates by impairing retinoic acid signaling. *Chem Res Toxicol*. 2010 Oct 18;23(10):1586-95. doi: 10.1021/tx1001749. Epub 2010 Aug 9. PMID: 20695457. Winnick, B.; Dzialowski, E. M. The effects of glyphosate based herbicides on chick embryo morphology during development. *The FASEB Journal*, Bethesda, v. 27, supl. 1, p. 874.12, 2013.